

## ماذا لو شعرت بالمرض بعد التطعيم؟

يجب أن تستشير طبيبك أو مقدّم الرعاية الصحية في أقرب وقت ممكن إذا مرضت أو شعرت بتوعك بعد التطعيم. إذا لم تكن قادراً على زيارة الطبيب، يجب عليك الاتصال بالخدمات التالية:


← **Nurse-on-Call** [ممرّضين تحت الطلب]  
على الرقم 1300 60 60 24

← **الخط الساخن الوطني المُخصّص لفيروس كورونا**  
على الرقم 1800 020 080

← **000** إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس أو تسارع في ضربات القلب، أو تُصدّر صغيراً عند التنفس، أو كنت مريضاً جداً أو تشعر بتوعك شديد

تتوفّر كل هذه الأرقام على مدار الساعة.

تعمل الحكومة الأسترالية على تطوير برنامج للمطالبات للأشخاص الذين عانوا من رد فعل قوي على لقاح كوفيد-19 وكان له آثاراً متوسطة إلى كبيرة عليهم.



## هل سأعاني من أي آثار جانبية بعد التطعيم؟

- ← قد تعاني من الآثار الجانبية بعد الجرعة الأولى أو الثانية أو الجرعتين من لقاح كوفيد-19
- ← قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة والمتوقّعة: الألم في موضع الحقنة والشعور بالتعب وآلام في العضلات وصداع وحمى وقشعريرة وآلام في المفاصل
- ← عادة ما تكون الآثار الجانبية خفيفة وتستمر ليوم أو يومين

## هل هناك أي آثار جانبية خطيرة أكثر؟

- ← هناك احتمال نادر جداً أن تعاني من آثار جانبية أخطر
- ← يمكنك مراجعة المعلومات عبر موقع حكومة ولاية فيكتوريا حول الآثار الجانبية الأكثر خطورة أو التحدّث إلى طبيبك لمعرفة المزيد



## كيف يمكنني إثبات أنني أخذت لقاح كوفيد-19؟

بمجرد أن تأخذ الجرعات الكاملة من اللقاح، سيتم إنشاء **شهادة رقمية لكوفيد-19** مخصصة لك تلقائياً.

يمكنك الحصول على شهادتك بثلاثة طرق:

إذا كان لديك بطاقة مديكير، يمكنك الحصول على شهادتك من خلال تطبيق **Express Plus Medicare** أو **myGov**



إذا لم يكن لديك بطاقة مديكير ولكن لديك معرّف رعاية صحية فردي، فيمكنك **طلب شهادة حصولك على اللقاح عبر الإنترنت** من خلال myGov

إذا لم يكن لديك بطاقة مديكير ولا معرّف رعاية صحية فردي، يمكنك **الاتصال بسجل التطعيم الأسترالي [Australian Immunisation Register] للحصول على شهادة ورقية**

يمكنك **إضافة شهادتك الرقمية لكوفيد-19** إلى تطبيق Service Victoria أو إبراز نسخة ورقية عنها.



كما يمكنك الآن الحصول على **شهادة دولية للتطعيم ضد كوفيد-19** لمساعدتك على إثبات أنك قد أخذت اللقاح بالكامل عند السفر إلى الخارج.




## هل من الممكن أن أنقل فيروس كوفيد-19 أو أن أصاب به حتى بعد أخذ اللقاح؟

بعد أخذ الجرعات الكاملة من لقاح كوفيد-19:

- ◀ تقلّ احتمالات إصابتك بكوفيد-19
- ◀ تقلّ احتمالات نقلك لكوفيد-19 للآخرين
- ◀ تقلّ احتمالات معاناتك من المرض الشديد إذا أصبت بكوفيد-19

لا يزال هناك احتمال للإصابة بالفيروس ونقله حتى بعد أخذك للقاح. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين:

- ◀ يجب عليك الاستمرار بممارسة السلوكيات التي تحميك من كوفيد [بما في ذلك ارتداء الكمامة التي تثبت بإحكام على الوجه]
- ◀ يجب عليك الاستمرار بالالتزام بالقيود الحالية



[cfre.org.au/lgbtiq-covid](https://cfre.org.au/lgbtiq-covid)

المعلومات الواردة في صحيفة الحقائق هذه مُحدّثة منذ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

المعلومات صادرة من دائرة الصحة في ولاية فيكتوريا ووزارة الصحة الأسترالية. يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول السلامة من كوفيد-19 واللقاحات بلغات أخرى من **الموقع الإلكتروني للحكومة ولاية فيكتوريا والموقع الإلكتروني للحكومة الأسترالية**.

Queerspace

Drummond Street Services

نحن نعترف بالأوصياء التقليديين للأرض التي نعمل عليها ونقدّم الاحترام لشيوخهم السابقين والحاضرين والمستقبليين.

